

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICOPP 01
Rev. 1 del 04.09.2024**Leggere attentamente tutto il documento e contattare il Cup in caso di eventuali ulteriori richieste****PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO****NEI GIORNI ANTECEDENTI ALL'INTERVENTO SEGUIRE UN REGIME DIETETICO SENZA SCORIE:**

(no frutta ,verdura e legumi...)

PRIVILEGIANDO: PASTINA, BRODINI, CARNE, PESCE, PHILADELPHIA, OMOGENEIZZATI, PREMUTE
FILTRATE, SUCCHI, LIQUIDI**DALLA MEZZANOTTE DEL GIORNO PRECEDENTE ALL'INTERVENTO:**

DIGIUNO (SENZA BERE NE' MANGIARE)

INOLTRE:

- DICHIARARE SE SI E' PORTATORI DI PROTESI O PACEMAKER
- MUNIRSI DI VESTAGLIA PER SPOSTAMENTI NELL'AMBITO DELLA CLINICA
- PRATICARE IGIENE PERSONALE (bagno o doccia) PRIMA DELL'INTERVENTO
- RIMUOVERE SMALTI O TRUCCHI
- PRESENTARSI PRIVI DI AMULETI, ORECCHINI, ANELLI, ECC.
- PRIMA DELL'INGRESSO IN SALA OPERATORIA RIMUOVERE, SE PRESENTI, PROTESI MOBILI (protesi dentarie, protesi auricolari, lenti a contatto)
- TRICOTOMIA (se necessaria)

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO PER PAZIENTI PEDIATRICI:

I PAZIENTI PEDIATRICI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A CHIRURGIA ELETTIVA CON ANESTESIA GENERALE O LOCO REGIONALE O CON SEDAZIONE DEVONO LIMITARE L'ASSUNZIONE DI ALIMENTI PER VIA ORALE PREOPERATORIAMENTE SECONDO SCHEMA:

<u>ETA' DEL BAMBINO</u>	<u>LATTE ED ALIMENTI SOLIDI</u>	<u>LIQUIDI CHIARI</u>
0-6 MESI	4 ORE	2 ORE
6 MESI-3 ANNI	6 ORE	3 ORE
3-14 ANNI	8 ORE (PASTO COMPLETO)	3 ORE

**PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO PER PAZIENTI IN PARTICOLARI
CONDIZIONI CLINICHE**

- **PAZIENTI CON ALTERAZIONI TIROIDEE** SENZA O IN TERAPIA ORMONALE
VALUTARE PROFILO TIROIDEO (FT3,FT4,TSH) DI NON OLTRE 3 MESI PRECEDENTI

- **PAZIENTI IN TERAPIA ANTI-IPERTENSIVA**
CONTINUARE LA TERAPIA FINO LA GIORNO DELL'INTERVENTO TRANNE PER GLI ACE-INIBITORI E I SARTANICI CHE ANDREBBERO SOSPESI 24 ORE PRIMA

- **PAZIENTI ALLERGICI A FARMACI**
 - ADULTI
ZIRTEC
COMPRESSE:
 - ✓ 1 CP IL MATTINO E SERA NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI ALL'INTERVENTO
 - ✓ 1 CP LA MATTINA DELL'INTERVENTO
 - BENTELAN 1 COMPRESSE :
 - ✓ 1 CP MATTINO E SERA NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI ALL'INTERVENTO
 - ✓ 1 CP LA MATTINA DELL'INTERVENTO

 - BAMBINI
ZIRTEC
COMPRESSE:
 - ✓ 1/2 CP IL MATTINO E SERA NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI ALL'INTERVENTO
 - ✓ 1/2 CP LA MATTINA DELL'INTERVENTO
 - BENTELAN 0.5 :
 - ✓ 1 CP IL MATTINO E SERA NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI ALL'INTERVENTO
 - ✓ 1 CP LA MATTINA DELL'INTERVENTO

- **PAZIENTI IN TERAPIA ANTIAGGREGANTE ED ANTICOAGULANTE**
TEMPI DI SOSPENSIONE DELLE TERAPIE (PREVIA SOSTITUZIONE CON EPARINA A B.P.M.):
 - ASA: 5-7GIORNI previo consulto con anestesista e/o cardiologo
 - TICLOPIDINA:10 GIORNI
 - CLOPIDOGREL:7 GIORNI
 - DICUMAROLICI:4-5 GIORNI PREVIO CONTROLLO INR
 - EPARINA A B.P.M.:12 ORE DI SOSPENSIONE, IN CASO DI POSIZIONAMENTO DI CATETERE PERIDURALE

La Direzione Sanitaria